

De waarde van echografische kenmerken inclusief vasculariteit in het voorspellen van myoom volume verandering bij follow-up: *gedurende het* ① **Natuurlijk beloop**, of ② **langdurige hormonale behandeling (>3 maanden)**; *na start van* ③ **Esmya of GnRH-analoog**, of ④ **hormonale behandeling**; *of na* ⑤ **Embolisatie** of ⑥ **ablatie therapie**.

## YES

- ≤ 3 Myomen\*
- 3 - 10cm
- Te vervolgen per transvaginale echo (TVE)
- Informed consent

\* Embolisatie of ablatie: multiple myomen toegestaan mits ≤ 3 myomen is te vervolgen per TVE

## NO

- Behandeling voorgaande 3 maanden: ③ Esmya of GnRH-analoog (tenzij hormonale behandeling) & ① Natuurlijk beloop
- Contra-indicatie voor de geplande behandeling < 18 jaar of postmenopauzaal
- Zwangerschap
- Verdinking maligniteit
- Ernstige adenomyose
- Fertiliteitsbehandeling: Clomid of hormonale stimulatie
- Aromatase remmers of tamoxifen

### Primaire uitkomsten

#### Volume verandering na:

1. Natuurlijk beloop - 1 jaar
2. Gedurende hormonale behandeling - 1 jaar
3. Esmya of GnRH-analoog - 3 maanden
4. Start hormonale behandeling - 1 jaar
5. Embolisatie - 6 maanden
6. Ablatie therapie - 6 maanden

### Secundaire uitkomsten

1. TVE
2. UFS-QoI
3. EQ-5D
4. PBAC-score
5. Hemoglobine
6. Treatment failure rate
7. (Re) intervention rate

