

VERWIJSSCHEMA MULTIDISCIPLINAIRE DIAGNOSTIEK TAAL-SPRAAK REGIO AMSTERDAM

Doelgroep: kinderen met taal- of spraakontwikkelingsstoornissen

Bij twijfel uitgaan van de problematiek die het meest op de voorgrond staat.

Toelichting: Vanuit het principe ‘juiste zorg op de juiste plek’ hebben Amsterdam UMC, Kentalis en de NSDSK een scherper onderscheid aangebracht tussen het tweedelijns- en derdelijnszorgaanbod op het gebied van spraaktaalproblematiek bij kinderen. Amsterdam UMC zal zich focussen op kinderen met derdelijns spraaktaalproblematiek, waarbij de tweedelijns spraak- en taaldiagnostiek voor kinderen met (een vermoeden van) TOS wordt ingezet bij de NSDSK en Kentalis. Verwijzers uit de regio Amsterdam worden daarom verzocht onderstaand verwijsschema te gebruiken bij het verwijzen van kinderen met spraak- en taalproblemen naar een audiologisch centrum.

Bij kinderen waarbij naast spraaktaalproblemen ook andere problemen aanwezig zijn die op de voorgrond staan, kan er wel indicatie zijn voor gehooronderzoek door een audiologisch centrum. In dat geval verzoeken wij dit duidelijk op de verwijzing te zetten.

Wanneer er geen twijfel is over het gehoor (alleen behoefte om gehoorverlies uit te sluiten) graag verwijzen naar Audiologisch Centrum Kentalis of NSDSK (niet A-UMC).

Indien er wel zorgen zijn over het gehoor (aanwijzingen voor verminderd gehoor bv observaties van niet reageren of zorgen ouders), graag verwijzen naar Audiologisch Centrum Kentalis in Amsterdam, NSDSK te Alkmaar of Amsterdam UMC.

| Problematiek / hulpvraag | NSDSK of Kentalis | Amsterdam UMC |
|---|-------------------|---------------|
| Taal | | |
| (Vermoeden van) taalontwikkelingsstoornis (TOS) | | |
| • Zonder medisch belaste voorgeschiedenis | + | - |
| • Met medisch belaste voorgeschiedenis | - | + |
| • Met in de voorgeschiedenis KNO-problematiek | + | + |
| • Taalverlies | - | + |
| Spraak | | |
| (Vermoeden van) spraakontwikkelingsstoornis | | |
| • Zonder medisch belaste voorgeschiedenis | + | + |
| • Vermoeden / uitsluiten organische spraakstoornis | - | + |
| • Vermoeden spraakontwikkelingsdyspraxie | + | + |
| • Nasaliteit zonder (diagnose) schisis | - | + |
| Bij gedragsproblemen | | |
| • Niet op zichzelf staand (taal- of spraakprobleem op de voorgrond) | + | - |
| • Wel op zichzelf staand (gedragsprobleem op de voorgrond) | - | - |