

# Toedienen van een drank met cytostatica via een sonde; informatie voor de patiënt en betrokkenen

Deze tekst geeft informatie over het veilig toedienen van een drank met cytostatica via een sonde.

## Het toedienen van een drank via een sonde

Wanneer u/de patiënt niet kan slikken en een sonde heeft, kan het cytostaticum met behulp van een spuitje via de sonde worden toegediend. Deze spuitjes worden door de apotheek klaargemaakt.

## Benodigdheden

- Handschoenen
- Spuit met cytostatica
- Spuit met water
- Afvalzak

## Algemeen: het gebruik van handschoenen

Denk eraan wanneer u handschoenen gebruikt dat u zo weinig mogelijk dingen vastpakt.

Wanneer u onverhoopt toch iets aanraakt, neem dit dan af met een zeepoplossing.

Als er cytostaticavloeistof geknoeid wordt, neem dit zo snel mogelijk op met een tissue. Daarna de plaats afnemen met een zeepoplossing.

## Uitvoering

Handeling	Toelichting
Was en droog uw handen	
Trek de handschoenen aan	
Pak de spuit met water en spuit minstens 5-20 ml door de sonde	
Overtuig u ervan dat u het juiste medicijn neemt/geeft, op het juiste moment en op de juiste manier	
Spuit de medicatie in	
Spuit de rest van het water door de sonde	
Deponeer al het afval in de afvalzak	

Trek handschoenen uit en deponeer deze in de afvalzak	De handschoenen worden onmiddellijk uitgedaan na de handeling om besmetting van de omgeving te voorkomen
Was en droog uw handen	
Neem/geef de patiënt voldoende te drinken (1,5 liter per dag)	Braakt u/de patiënt binnen twee uur, dan contact opnemen met de arts voor overleg of het medicijn opnieuw ingenomen moet worden

## Vragen

Als er problemen zijn met het toedienen, belt u dan het ziekenhuis voor overleg:  
 Volwassenafdeling Oncologie (kantooruren)      telefoonnummer 020 - 444 05 22