

Kinderallergologie

Stoppen met de medicijnen voor een allergie onderzoek bij uw kind; informatie voor ouders

Uw kind ondergaat binnenkort een allergietest. Bepaalde medicijnen kunnen de uitslag van de allergietest onbetrouwbaar maken. Daarom is het belangrijk dat uw kind sommige medicijnen een aantal dagen niet gebruikt. In deze folder krijgt u uitleg.

Wanneer moet uw kind stoppen?

De meeste medicijnen moet u minstens 3 dagen voor de allergietest bij uw kind stoppen. Als uw kind klachten krijgt na het stoppen van de medicijnen vragen wij u contact op te nemen. Ook medicijnen die u zelf, zonder recept, kunt kopen kunnen het onderzoek onbetrouwbaar maken.

Welke medicijnen moet uw kind stoppen?

Acrivastine	Dexchlorfeniramine	Meclozine
Alimemazine	Dimetindeen	Mizolastine
Cetirizine	Ebastine	Montelukast
Chloorcyclizine	Fexofenadine	Noscapine
Cinnarizine	Hismanal	Omalizumab
Clemastine	Hydroxyzine	Oxatomide
Cromoglicinezuur (drank)	Ketotifen	Oxomemazine
Cyclizine	Levocitirizine	Prednisolon (tablet of drank)
Cyproheptadine	Loratadine	Promethazine
Desloratadine	Mebhydroline	Rupatadine

Extra gebruik van puffjes, neus- of oogdruppels. Wanneer uw kind dagelijks puffjes of druppels gebruikt, moet uw kind dit blijven doen. Alleen bij extra gebruik neemt u contact met ons op.

Zalven voor huidaandoeningen

Op de dag van het onderzoek mag uw kind thuis geen hormoonzalf of andere zalf/olie gebruiken. Neem alle zalven mee naar uw afspraak op de polikliniek. In geval van een huidpriktest kan na afloop van dit onderzoek de huid worden ingesmeerd. Bij een voedselprovocatie kunt u, in overleg met de verpleegkundigen, na het lichamelijk onderzoek door de arts zo nodig bepaalde zalf smeren.