

Röntgenonderzoek van de baarmoeder

In het kader van het vruchtbaarheidsonderzoek is voor u een röntgenonderzoek van de baarmoeder en eileiders afgesproken. Dit onderzoek heet in medische taal ook wel 'hysterosalpingografie'. Bij dit onderzoek wordt bekeken of er afwijkingen zijn in de baarmoeder of aan de eileiders en of deze doorgankelijk zijn.

Let op!

Het is erg belangrijk dat er geen kans is dat u zwanger bent op het moment dat we het onderzoek doen. Dit betekent dat u geen geslachtsgemeenschap heeft (niet vrijen) tot de foto gemaakt is. Als u toch gemeenschap heeft gehad, gaat het onderzoek niet door.

Afspraak maken voor het onderzoek

We doen het onderzoek het liefst op een moment in uw cyclus dat de menstruatie net voorbij is, maar de eisprong nog niet heeft plaatsgevonden. Als dit niet mogelijk is, wordt het onderzoek uitgevoerd na de eisprong.

Voor het maken van de afspraak belt u op de eerste dag van de menstruatie naar de Polikliniek Voortplantingsgeneeskunde (VPG). Het onderzoek is op een dinsdagmiddag of op een vrijdagmiddag. Op de dag van de afspraak meldt u zich bij het [Imaging Center](#): Amsterdam UMC Imaging Center, Van der Boechorststraat 6A 1081 BT Amsterdam.

Vorbereiding op het onderzoek

Wij adviseren dat u op de avond voor het onderzoek 2 tabletten Naproxen (maximaal 250 mg per tablet) inneemt. Op de dag van het onderzoek neemt u 2 uur vóór het onderzoek ook 2 tabletten Naproxen in. U kunt deze tabletten kopen bij de drogist/apotheek.

Gebruikt u bloedverdunnende middelen? Neem dan 2 tabletten paracetamol (max 500mg per tablet) voor het onderzoek. Voor dit onderzoek hoeft u zich niet speciaal voor te bereiden. U kunt gewoon eten en drinken voordat u zich op de afdeling Radiologie meldt.

Het onderzoek

1. Tijdens dit onderzoek ligt u op de tafel van het röntgenapparaat. Er wordt een speculum (spreider) in de vagina gebracht en de baarmoederhals wordt schoongemaakt met betadine (soort jodium).

2. Hierna wordt een klein plastic cupje op de baarmoederhals aangesloten. Aan dit cupje zit een slangetje en via dit slangetje wordt met behulp van een pompje langzaam een contrastmiddel ingespoten.
3. Tijdens het inspuiten van de vloeistof kijken wij op een televisiescherm mee hoe de vloeistof door de baarmoeder en eileiders loopt. Het inspuiten van de vloeistof kan als reactie pijnlijke baarmoederkrampen geven; de Naproxen onderdrukt deze krampen grotendeels.
4. Daarna worden enkele foto's gemaakt door de röntgenlaborant. Als de baarmoeder of eileiders zijn afgesloten, kan de vloeistof niet vrij doorlopen. Na afloop gaat u een stukje lopen en wordt er nog een foto gemaakt. Deze laatste foto wordt ongeveer 30 minuten na de eerste serie foto's gemaakt. Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Na het onderzoek

De contrastvloeistof komt via de natuurlijke weg weer uit de baarmoeder, net als bij de menstruatie. U krijgt een maandverband na het onderzoek. Na het onderzoek zullen de krampen snel wegtrekken. U kunt een paar dagen last houden van bloederige/verkleurde afscheiding.

De foto's van het röntgenonderzoek worden besproken in het gynaecologisch team. Hier wordt ook besproken wat de volgende stap in de behandeling is. Uw behandelend arts zal u de uitslag van het onderzoek vertellen tijdens een gesprek. U krijgt de datum van dit gesprek te horen op het moment dat u de afspraak voor het onderzoek maakt.

Wanneer contact opnemen?

Neem contact op met de afdeling Polikliniek Voorplantingsgeneeskunde:

- als u buikpijn houdt na het onderzoek
- als de buikpijn toeneemt in de dagen na het onderzoek
- als u koorts krijgt (temperatuur boven 38,5 graden)

Tot slot

Het contrastmiddel bevat jodium. Als u overgevoelig bent voor jodium, zegt u dit dan voor het onderzoek aan uw arts, de verpleegkundige of de röntgenlaborant.

Als u niet naar een afspraak kunt komen, laat dit dan op tijd weten aan de afdeling Voortplantingsgeneeskunde.

Contact of meer informatie

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Amsterdam UMC, locatie VUmc Polikliniek Voortplantingsgeneeskunde en IVF-centrum

Gebouw Zuid

Amstelveenseweg 601

1081 JC Amsterdam

T (020) 444 3269 U kunt op maandag t/m vrijdag tussen 10.30 en 12.00 uur bellen met de polikliniek: (020) 444 3269. Kies voor optie 4.

www.vumc.nl/ivf