

Cabozantinib(Cometriq®) bij uitgezaaide medullaire schildklierkanker

Uw behandelend arts heeft een behandeling met Cabozantinib voorgesteld. Cabozantinib is een doelgerichte behandeling capsule vorm. Deze kunt u thuis innemen. Hieronder volgt informatie over het doel van de behandeling, de werking, de dosering en de mogelijke bijwerkingen van Cabozantinib.

Werking

Bij doelgerichte therapie worden er medicijnen gegeven om kankercellen te doden of de groei ervan te remmen. Deze medicijnen richten zich op specifieke eigenschappen van kankercellen. Dit doen ze do

or de werking van bepaalde eiwitten van de kankercel te blokkeren.

Cabozantinib is een tyrosine kinase remmers (afgekort TKI). Ze remmen bepaalde eiwitten en zorgen ervoor dat de cellen stoppen met delen. Hierdoor gaan de kankercellen dood.

Behandelplan

Cabozantinib wordt in capsule vorm voorgeschreven en u kunt ze thuis innemen. U neemt de capsules een keer per dag in. De dosering zal door uw internist-oncoloog besproken worden. Volgt u de instructies over inname van Cabozantinib op.

- Neem de capsule in met een half glas water. Slik het heel door, zonder kauwen of fijnmaken.
- Zorg ervoor dat u de capsules op een lege maag slikt. Dat betekent dat u 2 uur voor inname niets mag eten tot en met 1 uur na inname.
- U gebruikt dit medicijn 1 keer per dag. Kies hiervoor steeds hetzelfde moment van de dag, dan vergeet u minder snel een dosis.

(bron: apotheek.nl, 2022)

Bijwerkingen Cabozantinib

Uw behandeling heeft niet alleen invloed op kankercellen, maar ook op gezonde cellen in het lichaam. Bij het opstellen van deze lijst worden de meest voorkomende bijwerkingen die bij behandeling op kunnen treden genoemd.

Het wil niet zeggen dat alle genoemde bijwerkingen zich ook daadwerkelijk zullen voordoen. Het uitblijven van bijwerkingen wil niet zeggen dat de behandeling niet aanslaat. De volgorde waarin de bijwerkingen vermeld staan is willekeurig.

- maag- en darmklachten
- diarree
- hoge bloeddruk
- slechtere wondgenezing
- infecties
- koorts, griepachtig gevoel
- trombose
- vermoeidheid
- veranderingen in de smaak
- veranderingen aan de huid zoals uitslag, jeuk of eeltvorming
- verandering aan het haar of nagels

Voor een volledig overzicht van de bijwerkingen en adviezen kijkt u op de website

[Cabozantinib - Bijwerkingenbijkanker.nl](http://Cabozantinib-Bijwerkingenbijkanker.nl)
cabozantinib | Apotheek.nl

Op verzoek kan een uitdraai voor u gemaakt worden.

U moet direct contact opnemen met het ziekenhuis (zowel overdag, 's avonds, 's nachts en in het weekend):

Koorts

- Bij één keer koorts boven 38.5 graden
- Bij twee maal achter elkaar 38 graden koorts in een tussentijd van 6 uur
- Bij koude rillingen

Misselijkheid en braken

- Bij ernstig en aanhoudend braken gedurende 24 uur of langer
- Bij tekenen van uitdroging: droge mond, droge huid, weinig of niet meer plassen, donkere urine

Diarree

- Bij langer dan 24 uur aanhoudende diarree
- Bij tekenen van uitdroging: droge mond, droge huid, weinig of niet meer plassen, donkere urine

Obstipatie/Verstopping van de ontlasting

- Bij langer dan drie dagen aanhoudende obstipatie (harde ontlasting en/of verstopping)

Andere situaties waarin u direct moet bellen

- Bij aanhoudend bloeden van een wondje (langer dan 15 minuten)
- Bij een lang aanhoudende bloedneus (langer dan 15 minuten)

- Bij heviger bloedverlies tijdens menstruatie
- Bij hartkloppingen en duizeligheid
- Bij plotseling optredende kortademigheid, een gevoel van benauwdheid of een snelle ademhaling die u niet kunt corrigeren
- Bij pijnlijke plekjes in de mond en moeite met slikken waardoor u niet kunt eten of drinken
- Bij een pijnlijk en branderig gevoel bij het plassen

Bereikbaarheid bij lichamelijke klachten

Levensbedreigende situatie: bel 1-1-2.

Bij vragen lichamelijke klachten 9.00-16.00:

020-444 05 22 (optie 1)

Bij vragen lichamelijke klachten buiten kantoortijden:
(Verpleegafdeling oncologie 3C)

020-444 21 31