




Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Actieplan ernstige allergische reactie (Anafylaxie)

Patiënt			
Naam:			
Geboortedatum:			
Patiëntnummer:		Datum actieplan:	

Alléén huidreactie Zwelling, roodheid en/of jeuk van huid, lippen en/of oogleden	<u>Geef antihistaminicum:</u>
	Naam: Dosis:

Bij klachten van: <ul style="list-style-type: none"> • zwelling tong • zwelling keel • heesheid • benauwdheid • bewustzijnsdaling • herhaaldelijk braken • herhaaldelijk diarree 	Stap 1	Gebruik direct adrenaline noodpen. <i>Als klachten na 5 minuten niet duidelijk zijn afgenomen, gebruik dan een 2e (nieuwe) adrenaline noodpen als deze beschikbaar is.</i>
	Stap 2	Bel direct 112 en vraag om een ambulance
	Stap 3	<u>Astmapatiënten:</u> salbutamol (Ventolin, Airomir) - voorzetkamer (8 puffen) - inhalator (4 inhalaties)
	Stap 4	<u>Geef antihistaminicum:</u> Naam: Dosis:



Meer informatie over allergie is te lezen via de volgende website: www.nvvaki.nl.

Contactgegevens KNO:

Voor patienten locatie AMC: 020 566 2888

Voor patienten locatie VUmc: 020 444 0975