



Actieplan ernstige allergische reactie (Anafylaxie)

| | | | |
|----------------|--|------------------|--|
| Patiënt | | | |
| Naam: | | | |
| Geboortedatum: | | | |
| Patiëntnummer: | | Datum actieplan: | |

| | |
|--|--|
| Alléén huidreactie Zwelling, roodheid en/of jeuk van huid, lippen en/of oogleden | <u>Geef antihistaminicum:</u> Naam: |
| | Dosis: |

| | | |
|---|---------------|--|
| Bij klachten van: <ul style="list-style-type: none"> • zwelling tong • zwelling keel • heesheid • benauwdheid • bewustzijnsdaling • herhaaldelijk braken • herhaaldelijk diarree | Stap 1 | Gebruik direct adrenaline noodpen. <i>Als klachten na 5 minuten niet duidelijk zijn afgenomen, gebruik dan een 2e (nieuwe) adrenaline noodpen als deze beschikbaar is.</i> |
| | Stap 2 | Bel direct 112 en vraag om een ambulance |
| | Stap 3 | <u>Astmapatiënten:</u> salbutamol (Ventolin, Airomir) - voorzetkamer (8 puffen) - inhalator (4 inhalaties) |
| | Stap 4 | <u>Geef antihistaminicum:</u> Naam: |
| | Dosis: | |



Meer informatie over allergie is te lezen via de volgende website: www.nvvaki.nl.