

قسم أمراض النساء

جراحة تدلي الرحم: الجراحة التجميلية للجدار الأمامي

في هذا الكتيب، ستعرفين المزيد عن الجراحة التجميلية للجدار الأمامي والإلحاقي بجناح H5-South (جنوب-H5).

مقدمة.

سيتم إلحاقي قريباً إلى **Amsterdam UMC**, موقع **قسم أمراض النساء (H5-South)** (الجراحة التجميلية للجدار الأمامي). في هذا الكتيب، سوف تجدين معلومات عن تلك العملية. هذا الكتيب يهدف إلى إكمال ما أخبرك به الطبيب. إذا كانت لديك أيّة أسئلة، من فضلك اتصلي بمرضى العيادة الخارجية أو قسم التمريض. نتمنى لك عملية ناجحة وشفاء عاجل.

ما هي الجراحة التجميلية للجدار الأمامي؟

الجراحة التجميلية للجدار الأمامي هي عملية جراحية لإصلاح تدلي الجدار الأمامي لمثانة المهبل. يقوم طبيب النساء بإجراء هذه الجراحة من خلال الفرج. يتم إعادة الجدار الأمامي المترهل للفرج مع وجود المثانة خلفه، والذي ترینه أحياناً منتفقاً مثل الكرة في فتحة الفرج، إلى مكانه. أثناء الجراحة، يقوم طبيب أمراض النساء بفصل الجدار الموجود في منتصف الجدار الأمامي للمهبل عن المثانة الموجودة تحته. بعد ذلك، يتم تقوية النسيج الضام بين جدار المهبل والمثانة بالخيوط الجراحية. يمكن أن تستقر المثانة الآن على هذا، ويختفي التدلي. ثم يتم إزالة الأنسجة الزائدة من المهبل. بعد ذلك، يتم خياطة جدار الفرج فوق النسيج الضام والمثانة. بهذه الطريقة، يعود الجدار الأمامي للمهبل إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه، ويختفي الانفصال. يتم استخدام خيوط قابلة للذوبان. لا تستخدم الشبكة الجراحية/الألياف.

في نهاية الجراحة، يقوم الطبيب بإدخال سادة في المهبل وقسطرة في المثانة.

ما هي النتيجة؟

نتيجة نجاح هذه العملية حوالي 90-70%. بعض النساء ستتعانى من عودة تدلي الرحم على المدى القصير أو البعيد. التدلي الجديد لا يتسبب في مشاكل دائمة، لذا العملية الجديدة غير مطلوبة دائماً.

المضاعفات المحتملة

مع أي عملية جراحية، هناك فرصة لحدوث مضاعفات. يمكن أن تحدث المضاعفات الشائعة التالية:

- نزيف.
- عدوى بعد الجراحة (مثل التهاب المثانة). خلال الجراحة، كل العمليات تتم على أقصى درجة من النظافة (التعقيم). بالرغم من وجود تلك الاحتياطات، مازالت هناك فرصة ضئيلة لالتهاب في منطقة الرحم أو الحوض. في غرفة العمليات، سيتم إعطاؤك مضادات حيوية عبر الكانيولا.
- في بعض الأحيان يمكن أن يحدث تسرب للبول بعد جراحة التدلي. أكثر شيء شيوعاً، أنه يتضمن تسرب البول عند السعال أو العطس أو التبرز. إذا كان هذا يزعج كثيراً، وهناك علاجات متاحة.

- ضرر في الأعضاء المحيطة. ما يصل إلى 2% من عمليات إزالة الرحم عن طريق المهبل تتعدد مع وجود تلف في الأعضاء المحيطة مثل المثانة أو الأمعاء أو الحالب.
- سيتم معالجة الشكاوى من الألم باستخدام المسكنات. الألم المستمر، على سبيل المثال، الألم أثناء ممارسة الجنس نادر جدًا.

أخيرًا، حتى بعد الجراحة الناجحة، قد تكرر أعراض التدلي بعد سنوات. وذلك لأن العملية لا تقصي على سبب التدلي. لسوء الحظ، لا توجد علاجات تمنع تكرار المشاكل بشكل دائم. إذا كنت تعانين من تكرار تدلي الحوض، فيجب عليك مناقشة الأمر.

التحضير للعيادة الخارجية

قبل إجراء الجراحة، ستقومين باستشارة عبر (الفيديو) واحدة على الأقل مع العيادة الخارجية لـ Amsterdam UMC، موقع AMC، لإجراء مقابلة مع الطبيب. وبعد ذلك، سيتم تحديد موعد مع قسم التخدير.

العيادة الخارجية للتخيير

سيكون لديك موعد مع طبيب التخدير لمناقشة طريقة التسken (تخدير أو تخدير فوق الجافية) خلال الجراحة. طبيب التخدير خبير في مجال التخدير وإدارة الألم. طبيب التخدير سيسألك حول صحتك الحالية، والأمراض التي كانت لديك، والأدوية التي تستخدمينها، وحول الحساسية والحساسية ضد الأدوية. طبيب التخدير أيضًا سيسألك ما إذا كنت خضعت إلى عملية من قبل وعن تجاربك مع أدوية التخدير السابقة. سيتم قياس ضغط الدم الخاص بك، وسيتم تحديد موعد لاختبارات إضافية.

الترتيب

ستتلقين اتصالاً هاتفياً قبل أسبوع- أسبوعين من موعد الدخول المقرر.

الاستعدادات لجناح التمريض

سيتم إدخالك إلى جناح التمريض H5-South سواء في اليوم الذي يسبق الجراحة، أو في يوم الجراحة. المدة الإجمالية للإقامة في المستشفى يوم- يومان في المتوسط.

المقابلات والاختبارات في يوم الدخول

في يوم إدخالك، ستجري الممرضة مقابلة معاك، حيث ستسألك فيها عن استخدامك للأدوية، مع أشياء أخرى. من المهم أن تحضرى جميع الأدوية الخاصة بك في العبوة (العبوات) الأصلية عند دخولك. ستناشر الممرضة معك الأدوية التي يجب أن تتناوليها. سوف تسألك الممرضة أيضًا عما إذا كنت تعانين من حساسية تجاه أي دواء وحول صحتك. ستناشر الممرضة أيضاً وضع منزلك والشخص المسؤول عنك الذي ستنصل به. الشخص الذي يمكن الاتصال به هو الشخص الذي يمكن استدعائه بعد العملية لإبلاغه بأن العملية قد انتهت. يمكنك إعطائنا اسم شريكك أو أحد أفراد أسرتك أو صديقك المقرب كشخص للاتصال به. سيتم تسجيل رقم هاتف الشخص المسؤول. سيُجري مساعد طبي معك استبياناً طبياً، ويأخذ عينة من دمك. سيقوم طبيب النساء / أو المقيم بزيارتكم لمناقشة العملية معك مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لديك فحص آخر لأمراض النساء الداخلية.

مساء ما قبل العملية

في المساء الذي يسبق العملية، يمكنك أن تأكل ما تريدين حتى منتصف الليل. في يوم الجراحة، لا يجوز لك أن تأكل أو تشرب أي شيء لمدة 6 ساعات قبل الجراحة. حتى 6 ساعات قبل العملية، يمكنك تناول شيء خفيف مثل البسكويت أو رقائق البسكويت. حتى ساعتين قبل العملية، يمكنك شرب سوائل صافية. ضعي في اعتبارك أن جدول العملية قد يتغير، لذلك قد تضطرين إلى الحضور مبكرًا.

العملية

قبل العملية

- الممرضة ستعطيك ملابس للجراحة. يجب إزالة المجوهرات، ثقوب الجسم، مساحيق التجميل، وما فوق الرأس. إذا كنت ترتدين نظارات، عدسات لاصقة، أسنان مرکبة، يجب إزالتهن قبل الدخول إلى غرفة العمليات.

- للاستعداد للتخدير، سيتم إعطاؤك دواء للعملية. طبيب التخدير سيحدد تلك الأدوية، والتي تتضمن مسكنات وأو أقراص للاسترخاء/النوم.
- الممرضة ستأخذك أنت وسريرك إلى منطقة انتظار غرفة العمليات، غرفة الإفاقة. سيقوم خبير تخدير بالاعتناء بك مؤقتاً هنا.
- سيتم أخذك من غرفة الإفاقة من قبل طبيب التخدير ومساعده. ثم، سيكون فريق من الأطباء ومساعدي الجراحة بأخذك إلى الجراحة.

خلال العملية

- في غرفة العمليات، يتم فحص أحد إجراءات السلامة. سُيُطلب منك اسمك، وتاريخ ميلادك، وما لديك حساسية تجاهه، ومتي أكلت آخر مرة، وأخيراً، سيتم فحص سوار معصمك. سيتم أيضاً تأكيد الجراحة الخاصة بك.
- في غرفة العمليات، سيتم وضع كانيولا لك لإدخال السوائل والأدوية.
- أثناء الجراحة، ستلتقين تخديرًا فوق الجافية أو تخديرًا كلبيًا. إذا تلقيت تخديرًا، فستكونين فقدة للوعي وستكونين متصلة بجهاز يفحص العلامات الحيوية. سيتم أيضًا إدخال أنبوب تنفس في حلقك للتنفس أثناء الجراحة. نتيجة لذلك، قد تشعرين بعدم الراحة في حلقك لعدة أيام. لا يتطلب فوق الجافية إدخال أنبوب في الحلق.

بعد العملية

- بعد الجراحة، ستم إعادتك إلى غرفة الإفاقة. هنا ستبقين لبعض من الوقت تحت الملاحظة. سيتم توصيلك بأجهزة ملاحظة، وإذا لزم الأمر، ستلتقين أكسجينًا إضافيًّا عبر أنبوب يصل إلى الأنف. يتم ترك شاش كبير في المهدب (سدادة مهبلية). بالإضافة إلى ذلك، يتم إدخال قسطرة في المثانة لتصريف البول. هناك ممرضة متخصصة تعتني بك.
- ستتصل ممرضة النقاوة بأول شخص أعطيتني رقمه للتواصل لإبلاغه بانتهاء العملية. لن يتم إدلاء معلومات جوهرية.
- يمكنك عادة تناول الطعام مباشرة بعد الجراحة.

أول يوم بعد العملية والخروج من المستشفى

من حيث المبدأ، من الممكن العودة إلى المنزل في اليوم الأول بعد الجراحة. ستم إزالة الكانيولا. بعد الجراحة، من المهم البدء في التحرك في أسرع وقت ممكن. سوف ترشدك الممرضة في ذلك. في صباح اليوم التالي للجراحة، ستم إزالة القسطرة والسدادة المهبلية. سيتم إجراء فحص روتيني لمعرفة ما إذا كنت تتبولين بشكل كافٍ. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتم تعليمك كيفية إفراغ المثانة بنفسك (القسطرة)، أو سيتم إعطاؤك قسطرة لأخذها إلى المنزل لبضعة أيام أخرى. بعد هذه الجراحة، نادرًا ما تكون هناك حاجة إليها.

الخروج

عند الخروج من المستشفى، ستجرين مقابلة مع طبيب الجناح. سيتم إعطاؤك خطاباً إلى طبيبك العام وأي وصفة (وصفات) للأدوية. بالإضافة إلى ذلك، س يقدم لك الطبيب والممرضة تعليمات حول العيش ومتى يجب عليك الاتصال بالمستشفى.

النقاوة

قد يستغرق التعافي من الجراحة 4-6 أسابيع.

سوف تلتقين نصائح من المستشفى حول مسكنات الآلام والملينات.

في الأسابيع الستة الأولى قواعد الحياة التالية لا يجب أن تتضمن على حمل الأشياء الثقيلة، ولا السباحة أو الاستحمام، ولا استخدام السادات القطنية، ولا الجماع. بعد حوالي أربعة أسابيع، يمكنك البدء في ركوب الدراجات مرة أخرى، بشرط أن تسمح بذلك. قد يحدث النزيف المهبلی لمدة تصل إلى ستة أسابيع بعد الجراحة. يجب لا تستخدمي السادات القطنية في هذا الوقت. سيقل فقدان الدم ببطء وغالباً ما يتحول إلى إفرازات بنية أو صفراء. ستذوب أي غرز في الفرج من تقاء نفسها. قد تخرج من تقاء نفسها لأكثر من ستة أسابيع بعد الجراحة. قد تكون القواعد التي تحصلين عليها من المستشفى مختلفة عن تلك المذكورة أعلاه. إذا كان الأمر كذلك، يرجى الالتزام بالقواعد التي حصلت عليها من المستشفى.

طالما أنك لست في حالة جيدة ولا يمكنك رفع أشياء ثقيلة، فقد تكون المساعدة المنزلية مرغوبة. إذا لم يكن لديك شريك أو أطفال بالغون يعيشون في المنزل، فيمكنك التقدم بطلب للحصول على هذا قبل العملية في مكتب قانون الدعم الاجتماعي. ومع ذلك، فإن هذا ينطوي على مدفوعات شخصية. بالطبع، يمكنك أيضًا ترتيب المساعدة المنزلية بنفسك.

الغاية بالناهيين

سيكون لديك موعد في العيادة الخارجية لأمراض النساء بعد 6 أسابيع من الجراحة.
على أية حال، إذا كانت لديك أي أعراض، يمكنك دائمًا الاتصال بنا قبل ذلك.

متى عليك الاتصال بنا؟

في حالة حدوث أحداث غير متوقعة في فترة ما بعد الجراحة، مثل الحمى، الألم الشديد، فقدان الدم بشكل كثيف، عدم المقدرة على التبول بشكل سليم، اتصل بقسم أمراض النساء الخاص بـ **UMC Amsterdam**، موقع **AMC 020-5663665** مباشرةً.

لنلخص ذلك

إذا كانت لديك أية أسئلة أو شكاوى، لا تترددوا بالاتصال بطبيبك المعالج.

Source

IUGA, www.iuga.org/patientinfo and www.NVOG.nl.