

Checklist behandeling PRRT

Een handig hulpmiddel om inzicht te krijgen in de activiteiten rondom uw PRRT behandeling. U kunt deze zelf of samen met de verpleegkundig consulent of internist-oncoloog invullen.

PRRT behandeling 1

Datum:

| Activiteit | Datum | Bijzonderheden | ✓ |
|--|-------|--|---|
| Gesprek met nucleair geneeskundige over de behandeling. | | Deze informatie heeft u nodig om u goed voor te bereiden op de behandeling. Leefregels na PRRT worden besproken. | |
| Stop lanreotide (Somatuline®). | | 6 weken voorafgaand aan PRRT behandeling moet u stoppen met de lanreotide (Somatuline®), indien u deze gebruikt. | |
| Verpleegkundig consult spuitinstructie octreotide (Siroctid®). | | Hierover krijgt u uitleg. Indien bij u van toepassing. | |
| Start octreotide (Siroctid®). | | Max. 2 weken voorafgaand aan PRRT behandeling. 3 x daags 100mcg. | |
| Bezoek aan arts in ziekenhuis en bloedonderzoek. | | Voorafgaand aan PRRT behandeling om te kijken hoe u zich voelt en of de labwaarden goed genoeg zijn. | |
| Stopdatum (Siroctid®). | | Op de avond voorafgaand aan uw PRRT behandeling moet u stoppen met de Siroctid injecties. Indien bij u van toepassing. | |
| Start PRRT behandeling. | | De dag van de behandeling | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Scan na PRRT. | | Deze scan wordt een dag na de PRRT behandeling gemaakt om te kunnen vaststellen of de radioactiviteit goed door de tumoren is opgenomen. | |
| Herstart lanreotide (Somatuline®). | | U mag een dag na de PRRT behandeling weer herstarten met de lanreotide (Somatuline®). Attentie: niet de Siroctid spuitjes! | |
| Einde leefregels PRRT. | | Een week na de PRRT behandeling. | |
| Telefonisch consult Verpleegkundig consulent. | | U krijgt een telefonische afspraak 1-2 weken na de PRRT behandeling. | |
| Bezoek arts in het ziekenhuis. | | Controle na uw PRRT behandeling 6 weken na toediening. | |

PRRT behandeling 2

Datum:

| Activiteit | Datum | Bijzonderheden | √ |
|---|-------|--|---|
| Bezoek arts in het ziekenhuis en bloed prikken. | | Voorafgaand aan PRRT behandeling om te kijken hoe u zich voelt en of de labwaarden goed genoeg zijn. | |
| Stop lanreotide (Somatuline®). | | 6 weken voorafgaand aan PRRT behandeling moet u weer stoppen met de lanreotide (Somatuline®), indien u deze gebruikt. | |
| Start octreotide (Siroctid®). | | Max. 2 weken voorafgaand aan PRRT behandeling. Indien van toepassing. | |
| Stopdatum (Siroctid®). | | Op de avond voorafgaand aan uw PRRT behandeling moet u stoppen met de Siroctid injecties. Indien bij u van toepassing. | |
| Start PRRT behandeling. | | De dag van de behandeling. | |
| Scan na PRRT. | | Deze scan wordt gemaakt om te kunnen vaststellen of de radioactiviteit goed door de tumoren is opgenomen. | |
| Herstart lanreotide (Somatuline®). | | U mag een dag na de PRRT behandeling weer herstarten met de lanreotide (Somatuline®). | |
| Einde leefregels PRRT. | | Een week na de PRRT behandeling. | |
| Telefonisch consult Verpleegkundig consulent. | | U krijgt een telefonische afspraak 1-2 weken na de PRRT behandeling. | |
| Bezoek arts in het ziekenhuis. | | Controle na uw PRRT behandeling 4-6 weken na toediening. | |
| CT scan. | | U krijgt voorafgaand aan de derde PRRT behandeling een CT scan. | |

PRRT behandeling 3

Datum:

| Activiteit | Datum | Bijzonderheden | √ |
|--|-------|---|---|
| Bezoek arts in het ziekenhuis en bloedprikken. | | Voorafgaand aan PRRT behandeling om te kijken hoe u zich voelt en of de labwaarden goed genoeg zijn plus de uitslag van de CT scan besproken. | |
| Stop lanreotide (Somatuline®). | | 6 weken voorafgaand aan PRRT behandeling moet u stoppen met de lanreotide (Somatuline®), indien u deze gebruikt. | |
| Start octreotide (Siroctid®). | | Max. 2 weken voorafgaand aan PRRT behandeling. 3 x daags 100mcg indien bij u van toepassing. | |
| Stopdatum (Siroctid®) | | Op de avond voorafgaand aan uw PRRT behandeling moet u stoppen met de Siroctid injecties. Indien bij u van toepassing. | |
| Start PRRT behandeling. | | De dag van de behandeling. | |
| Scan na PRRT. | | Deze scan wordt gemaakt om te kunnen vaststellen of de radioactiviteit goed door de tumoren is opgenomen. | |
| Herstart lanreotide (Somatuline®). | | U mag een dag na de PRRT behandeling weer herstarten met de lanreotide (Somatuline®). | |
| Einde leefregels PRRT. | | Een week na de PRRT behandeling. | |
| Telefonisch consult Verpleegkundig consulent. | | U krijgt een telefonische afspraak 1-2 weken na de PRRT behandeling. | |
| Bezoek arts in het ziekenhuis. | | Controle na uw PRRT behandeling 4-6 weken na toediening. | |

PRRT behandeling 4

Datum:

| Activiteit | Datum | Bijzonderheden | √ |
|---|-------|--|---|
| Bezoek arts in het ziekenhuis en bloed prikken. | | Voorafgaand aan PRRT behandeling om te kijken hoe u zich voelt en of de labwaarden goed genoeg zijn. | |
| Stop lanreotide (Somatuline®). | | 6 weken voorafgaand aan PRRT behandeling moet u weer stoppen met de lanreotide (Somatuline®), indien u deze gebruikt. | |
| Start octreotide (Siroctid®). | | Max. 2 weken voorafgaand aan PRRT behandeling. Indien van toepassing. | |
| Stopdatum (Siroctid®). | | Op de avond voorafgaand aan uw PRRT behandeling moet u stoppen met de Siroctid injecties. Indien bij u van toepassing. | |
| Start PRRT behandeling. | | De dag van de behandeling. | |
| Scan na PRRT. | | Deze scan wordt gemaakt om te kunnen vaststellen of de radioactiviteit goed door de tumoren is opgenomen. | |
| Herstart lanreotide (Somatuline®). | | U mag een dag na de PRRT behandeling weer herstarten met de lanreotide (Somatuline®). | |
| Einde leefregels PRRT. | | Een week na de PRRT behandeling. | |
| Telefonisch consult Verpleegkundig consulent. | | U krijgt een telefonische afspraak 1-2 weken na de PRRT behandeling. | |
| CT scan. | | U na uw laatste PRRT behandeling een CT scan. | |
| Bezoek arts in het ziekenhuis. | | Controle na uw laatste PRRT behandeling, 4-6 weken na toediening. Ook worden vervolfspraken gemaakt. | |

Bereikbaarheid

Afdeling Nucleaire Geneeskunde
maandag t/m vrijdag tussen 8.00 -12.00- 14.00-16.00 uur

020-444 28 74

Levensbedreigende situatie:

bel 1-1-2.

Bij vragen lichamelijke klachten 9.00-16.00:

020-444 05 22 (optie 1)

Bij vragen lichamelijke klachten buiten kantoortijden:
(Verpleegafdeling oncologie 3C)

020-444 21 31

Max den Holder

Verpleegkundig consulent neuro-endocriene tumoren 06-257 16 198
(maandag-dinsdag-vrijdag 8.30-15.30)

Email: net-amsterdam@amsterdamumc.nl

Ruimte voor vragen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

