

## Longfunctie

# Stoppen met medicatie voorafgaand aan inspanningsonderzoek bij kinderen

Jouw arts heeft een inspanningsonderzoek voor jou aangevraagd. Sommige medicijnen kunnen het onderzoek beïnvloeden. Daarom vragen wij jou om inname van het door jou gebruikte medicijn te stoppen volgens onderstaande lijst. Wanneer je toch een van deze geneesmiddelen hebt ingenomen, verzoeken wij jou telefonisch contact op te nemen met de afdeling longfunctie (telefoon: 020-444 4324 tussen 08:00 en 16:30 uur).

Ook als je nog vragen hebt over het al dan niet en op welk tijdstip stoppen van medicatie, kun je dit nummer bellen.

**Inhalatie beta-mimetica kortwerkend****8 uur**

- Aerolin<sup>R</sup> - salbutamol
- Aeromir<sup>R</sup> - salbutamol
- Berotec<sup>R</sup> - fenoterol
- Bricanyl<sup>R</sup> - terbutaline
- Ventolin<sup>R</sup> - salbutamol

**Inhalatie beta-mimetica langwerkend****48 uur**

- Atimos<sup>R</sup> - formoterol
- Foradil<sup>R</sup> -formoterol
- Oxis<sup>R</sup> - formoterol
- Plusvent<sup>R</sup> - salmeterol
- Serevent<sup>R</sup> - salmeterol

**Inhalatie beta-mimetica langwerkend + inhalatie steroïd****48 uur**

- Seretide<sup>R</sup> -salmeterol + fluticason
- Symbicort<sup>R</sup> -formoterol + budesonide
- Foster<sup>R</sup> - formoterol + beclometason
- Fostair<sup>R</sup> - formoterol + beclometason
- Flutiform<sup>R</sup>- formoterol + fluticason

**Inhalatie anti-cholinergica (kortwerkend)****24 uur**

- Atrovent<sup>R</sup> - ipratropium
- Berodual<sup>R</sup> - fenoterol + ipratropium
- Combivent<sup>R</sup>- salbutamol + ipratropium

Ipramol<sup>R</sup> - salbutamol + ipratropium

**Inhalatie anti-cholinergica (langwerkend)**

**4 dagen**

Spiriva<sup>R</sup> -tiotropium

**Antileukotriënen**

**24 uur**

Singulair<sup>R</sup> -montelukast

**Cromoglycaat en verwante stoffen**

Allergocrom<sup>R</sup>, Lomudal<sup>R</sup>, Lomusol<sup>R</sup> -cromoglicinezuur **8 uur**

Tilade<sup>R</sup> -nedocromil **48 uur**

**Theophyllines**

**48 uur**

Euphylline<sup>R</sup>, Theolair<sup>R</sup>, Theolair retard<sup>R</sup> -theophylline

**Antihistaminica**

**48 uur**

Aerius<sup>R</sup> - desloratadine

Allerfre<sup>R</sup> - loratadine

Atarax - hydroxizyne

cetirizine

Claritine<sup>R</sup> - loratadine

desloratadine

Fenistil<sup>R</sup> - dimitindeen

Kestine<sup>R</sup> - ebastine

levocetirizine

loratadine

Mebhydroline - napadisilaat

Mircol<sup>R</sup> - mequitazine

Mizollen<sup>R</sup> - mizolastine

Neoclarityn<sup>R</sup> - desloratadine

Polaramine<sup>R</sup> - dexchlorfeniramine

Prometazine (zowel drank als tabletten)

Reactine<sup>R</sup> - cetirizine

Semprex<sup>R</sup> - acrivastine

STP-free<sup>R</sup> - fexofenadine

Tavegil<sup>R</sup> - clemastine

Telfast<sup>R</sup> - fexofenadine

Tinset<sup>R</sup> - oxatomide

Triludan<sup>R</sup> - terfenidine

Xyzal<sup>R</sup> - levocetirizine

Zaditen<sup>R</sup> - ketotifen

Zyrtec<sup>R</sup> - cetirizine

**Inhalatie of orale steroïden****niet stoppen**

- Aerobec<sup>R</sup> -beclometason
- Alvesco<sup>R</sup> - ciclesonide
- Becotide<sup>R</sup>, Becloforte<sup>R</sup> -beclometason
- Celestone<sup>R</sup> -betametason
- Dexamethasonum
- Flixotide<sup>R</sup> -fluticason
- Prednison en Prednisolonum
- Pulmicort<sup>R</sup> -budesonide
- Qvar<sup>R</sup> -beclometason

**Neusspray (corticosteroïden)****niet stoppen****Oogdruppels****niet stoppen**

**Vóór het inspanningsonderzoek graag sportkleding en - schoenen meenemen en drie uur voor het onderzoek geen zware inspanning leveren.**