

Prikinstructie Fyremadel®

Hoe prikt u Fyremadel®?

De spuitjes zijn kant-en-klaar: u haalt het dopje eraf en kunt het middel inspuiten in de buikplooi. Deze folder beschrijft de prikinstructie voor een injectie Fyremadel®. Op de website amc.nl/cvv staat ook een filmpje.

Wat moet u doen voorafgaand aan de injectie?


- U zet de naaldenemmer klaar.
- U wast uw handen met zeep.

De injectie

- Open de verpakking en haal het dopje van het kant-en-klaar spuitje af. Het is niet nodig het spuitje te ontlichten.



- Pak een huidplooi van de buik. Het is niet nodig om de huid eerst te ontsmetten.
- Neem de spuit en prik snel, (45 graden schuin tot loodrecht) in de huid. Zorg ervoor dat de hele naald in de huid zit. Druk de spuit in drie à vijf seconden helemaal leeg. Trek daarna de naald snel weer uit de huid.



- Soms bloedt het een beetje. Dit is niet erg: de medicatie is er niet uitgebloed. Druk de plaats van de injectie met een watje dicht en plak er zo nodig een pleister op.
- De injectiespuit met naald doet u in de naaldenemmer. Een volle emmer klikt u dicht en levert u in bij uw apotheek.



Tijdstip van injecteren

De tijdstippen van Fyremadel® gebruik luisteren nauw. Afhankelijk van uw schema heeft u instructie gekregen om of 's ochtends of 's avonds (tussen 18.00 en 22.00 uur) te spuiten. Dien u zelf elke dag rond het zelfde tijdstip een injectie toe. Als u meer dan 6 uur te laat bent en dus de tijd tussen twee injecties langer is dan 30 uur, dien deze injectie dan zo snel mogelijk toe en neem contact op met ons op.

De eisprong wordt opgewekt met Pregnyl® of Triptofem®. De tijd tussen de laatste Fyremadel®-injectie en de Pregnyl®- of Triptofem®-injectie mag niet meer dan 30 uur zijn, omdat anders alsnog een voortijdige eisprong kan optreden. Daarom geldt dat als u Fyremadel® 's morgens toedient, u daarmee door moet gaan tot en met de dag dat u de injectie om de eisprong op te wekken (dag van Pregnyl® of Triptofem®) moet prikken. Als u Fyremadel® 's avonds toedient, gelden er andere afspraken. Volg de instructies op en neem bij twijfel altijd contact met ons op.

Injecties alleen via poliklinische apotheek van uw locatie

U kunt alleen bij de poliklinische apotheek van AmsterdamUMC medicatie ophalen en niet bij uw eigen apotheek of een apotheek van een ander ziekenhuis vanwege de overheveling van de fertiliteitshormonen naar het behandelend ziekenhuis. Uw recepten wordt door digitaal verstuurd naar de poliklinische apotheek van uw behandellocatie. Dit betekent niet dat uw medicatie klaarstaat. De apotheek zoekt als u zich aanmeldt, uw digitale recept op.

Bent u op locatie VUMC in gebouw zuid in behandeling?

Dan kunt u alleen bij de [poliklinische apotheek VUMC](#) op de Boelelaan terecht. De Poliklinische Apotheek VUMC bevindt zich in het polikliniek gebouw van het VUMC op de Boelelaan. Op de begane grond loopt u rechtdoor langs de receptie naar de apotheek toe. De apotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur. Controleer vooraf de openingstijden van hun website. De apotheek heeft op beperkte schaal een kluisdienst.

Bent u op locatie AMC in gebouw Q in behandeling?

Dan kunt u alleen bij de [poliklinische apotheek AMC](#) terecht. De Poliklinische Apotheek AMC bevindt zich in de hoofdingang. De Poliklinische Apotheek AMC is overdag, avond en in het weekend geopend. Controleer vooraf de openingstijden van hun website. Voordat er medicatie aan u kan worden geleverd moet u zich hebben ingeschreven bij deze apotheek en moet er een medicijncontrole met uw eigen apotheek hebben plaatsgevonden. Het is niet mogelijk deze medicijncontrole buiten kantooruren te doen omdat uw eigen apotheek dan gesloten is vandaar dat dit vooraf aan u wordt gevraagd.

Onverwacht te weinig injecties

Belangrijk: wij raden u aan om uw voorraad injecties nauwgezet te controleren.

Het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde heeft geen injecties op voorraad. Als u meer injecties nodig heeft, neem dan via “Mijn Dossier” contact met ons op. Doe dit op tijd want het is belangrijk dat u zichzelf elke dag op het zelfde tijdstip prikt. Hebt u direct een injectie nodig buiten onze kantooruren, neem dan contact op met de dienstdoende gynaecoloog van het AMC (via de SpoedEisende Hulp Vrouwenziekten, SEHV, tel. 020-5661500). Deze kan een noodrecept verstrekken maar alleen binnen de openingstijden van de [Poliklinische Apotheek AMC](#).

Onverwacht te weinig injecties

Belangrijk: wij raden u aan om uw voorraad injecties nauwgezet te controleren.

De Voortplantingsgeneeskunde heeft geen injecties op voorraad. Als u meer injecties nodig heeft, neem dan via “Mijn Dossier” contact met ons op. Doe dit op tijd want het is belangrijk dat u zichzelf elke dag rond het zelfde tijdstip prikt; in ieder geval tussen 16.00 en 22.00 uur. Hebt u direct een injectie nodig buiten onze kantooruren, neem dan contact op met de dienstdoende gynaecoloog van het AMC (via de SpoedEisende Hulp Vrouwenziekten, SEHV, tel. 020-5661500). Deze kan een noodrecept verstrekken maar alleen binnen de openingstijden van de [Poliklinische Apotheek AMC](#).

Onverwacht hulp nodig buiten kantooruren

Hebt u direct hulp nodig buiten onze kantooruren, neem dan contact op met de dienstdoende gynaecoloog van het AMC (via de SpoedEisende Hulp Vrouwenziekten, SEHV, tel. 020-5661500). Woont u ver van het AMC dan is het ook mogelijk om u te laten helpen bij een huisartsenpost in uw omgeving of bij het ziekenhuis dat u verwezen heeft.

Verspilling

Wij werken samen met u en de poliklinische apotheek AMC om verspilling van medicatie tegen te gaan. Hou daarom goed bij hoeveel injecties u nog thuis hebt zodat wij een recept op maat voor u maken. Overgebleven medicatie kan nooit aan andere patiënten worden verstrekt. Wij vragen u om overgebleven medicatie zo lang mogelijk te bewaren; ook als u net zwanger bent. Pas als

uw medicatie “over de datum” oftewel verlopen is, lever deze dan ter vernietiging in bij een apotheek. Gooi medicatie nooit bij uw huisvuil.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen kijk dan in de folder “veegestelde vragen”. Vindt u daar het antwoord niet, dan kunt u contact opnemen via “Mijn Dossier”.

Indien u geen computer of smartphone heeft, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

- Locatie VUmc 020-4443269
- Locatie AMC 020-5664287

Veelgestelde vragen	
Hoe werkt de medicatie?	Bevat Ganirelix dat de werking van het natuurlijke gonadotrofine releasing hormoon (GnRH) tegen gaat en daarmee de afgifte van luteïniserend hormoon (LH) remt. Het doel is een spontane eisprong (door natuurlijk LH) te voorkomen.
Geeft deze medicatie dezelfde zwangerschapskansen als andere medicaties?	Alle soortgelijke medicaties die voor dit doel (voorkomen van een eisprong) gebruikt worden in andere fertiliteitsklinieken resulteren in zelfde kans op een levend geboren kind
Via welke weg moet de medicatie toegediend worden?	Door middel van een injectie in de buikplooi
Wanneer moet ik de medicatie toedienen?	Toediening één keer per dag, op een vast zelf gekozen moment tussen 18u en 22u gedurende ongeveer 7 dagen.
Is het noodzakelijk om de medicatie altijd stipt op hetzelfde tijdstip toe te dienen?	De medicatie moet steeds op hetzelfde tijdstip worden toegediend.
Is de medicatie kant-en-klaar voor toediening?	Vereiste voorbereiding: handen wassen en naaldenemmer pakken.
Kan ik de medicatie zelf leren toedienen?	Zelf toedienen vereist: het bestuderen van de prikinstructie op onze website, mogelijk werd dit ook door uw hulpverlener gedemonstreerd tijdens de uitgangsecho
Kan de voorbereiding van de medicatie leiden tot bezorgdheid?	Met behulp van de prikinstructies op onze website zal het u zeker lukken.
Kan de toediening van de medicatie leiden tot onzekerheid of vragen?	De naald is klein, dun en scherp. De eerste keer spuiten is het spannend, neem er daarom de tijd voor en vraag steun van je partner of een ander ondersteunend persoon

Veelgestelde vragen	
Heeft de medicatie psychologische bijwerkingen?	Fertiliteitsbehandelingen zijn spannend. Volgens de bijsluiter zijn er geen psychologische bijwerkingen
Heeft de medicatie algemene bijwerkingen?	Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers) komen hoofdpijn, misselijkheid of malaise (algemeen gevoel van ziek zijn) voor. Zie ook de bijsluiter .
Heeft de medicatie lokale bijwerkingen?	Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers) kan de injectieplaats rood, licht gezwollen en pijnlijk zijn. De lokale reactie verdwijnt meestal binnen 4 uur na toediening.
Hoeveel kost de medicatie (gemiddeld) per cyclus voor mezelf en voor de maatschappij?	Voor uw eigen rekening: € 0 (als behandeling binnen basisverzekering). Kosten voor de maatschappij: 1 injectie circa € 34,93. Per cyclus zijn de kosten gemiddeld tussen € 245. Actuele kosten via www.medicijnkosten.nl . Deze kosten zijn exclusief de afleverkosten voor de apotheek.
Kan ik de medicatie gemakkelijk buitenshuis meenemen (bv. naar werk of sociale activiteit) en valt de medicatie op als gericht op fertiliteit?	De verpakking met alle benodigdheden past gemakkelijk in uw handtas. Aangezien de buik ontbloot moet worden voor het injecteren van de buikplooï kan een aparte kamer handig zijn. Echter, het valt mogelijks op voor uw omgeving dat deze medicatie met fertiliteit te maken heeft omdat reguliere ziektes over het algemeen geen injecties behoeven
Hoe moet de medicatie bewaard worden en hoe dienen de toedieningsmiddelen weggevoerd te worden?	Voor dit geneesmiddel zijn geen speciale bewaarcondities vereist. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Als u naar het buitenland gaat, dan heeft u een medische verklaring nodig. Bij de grenscontrole moet u kunnen aantonen welke medicatie u vervoert. U kunt deze verklaring tijdens een bezoek of per Mijn Dossier vragen. De spuit met naald dient u weg te werpen in de naaldenemmer en de volle emmer in te leveren bij de apotheek.
Welke rol kan mijn eventuele partner spelen bij het gebruik van de medicatie?	Uw eventuele partner kan u herinneren aan het tijdig toedienen van de medicatie en zou u kunnen helpen met voorbereiding en/of toediening van de medicatie
Bijsluiter	De bijsluiter https://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h111978.pdf