

# Stoppen met medicijnen voor de huidtest met inhalatie-allergenen of voeding

U hebt binnenkort een afspraak voor een huidpriktest. Door de uitslag van deze huidtest kunnen we zien of u allergisch bent voor bepaalde stoffen. Bepaalde medicijnen kunnen deze huidtest verstoren. Als u zulke medicijnen gebruikt, moet gekeken worden of het mogelijk is om daar voor de huidtest mee te stoppen.

## Lijst met medicijnen die u veilig kunt stoppen

In deze folder vindt u een lijst met de namen van medicijnen die de huidtest kunnen verstoren. Het gaat hier om medicijnen die u veilig - zonder overleg met uw arts - kunt stoppen voordat u voor de huidtest op de poli komt.

Met het innemen van de medicijnen die in de lijst genoemd staan moet u uiterlijk 3 dagen voor het polibezoek stoppen.

## Corticosteroidzalven (hormoonbevattende zalven)

Corticosteroidzalven mag u 7 dagen voor de huidtest niet meer op de onderarmen en/of rug smeren. Als dit niet lukt, omdat u dan meer klachten van de huid krijgt, neem dan contact op met de verpleegkundige van de poli KNO, locatie VUmc: 020 4441140 of locatie AMC: 020 566 2888.

## U gebruikt medicijnen die niet in deze folder staan

Gebruikt u medicijnen die niet in deze folder staan, dan vragen wij u contact op te nemen met de polikliniek KNO. De allergie-assistente van deze polikliniek kan u vertellen of deze medicijnen de huidtest kunnen verstoren. Is dat het geval, dan gaat de allergie-assistente na of het mogelijk is om met deze medicijnen te stoppen. Misschien zijn deze medicijnen zo belangrijk voor uw gezondheid, dat u er niet mee mag stoppen. Stop nooit zonder overleg met de polikliniek met medicijnen die niet in deze folder genoemd worden!

## Als u de genoemde medicijnen niet kunt stoppen

Als u medicijnen gebruikt die de huidtest kunnen verstoren, maar u kunt deze niet stoppen, bijvoorbeeld omdat u klachten krijgt, kan de huidtest niet bij u doorgaan. Neemt u dan s.v.p. contact op met de allergie-assistente van de poli KNO locatie VUmc: 020 444 1140 of locatie AMC: 020 566 2888. Deze stelt de specialist daarvan op de hoogte. In dat geval kan dan via bijvoorbeeld een bloedonderzoek gekeken worden of u mogelijk allergisch bent.

## **Medicijnen die u veilig kunt stoppen voorafgaand aan de provocatietest**

Let op: er worden alleen stofnamen genoemd, geen merknamen! Kijk s.v.p goed op de verpakking naar de stofnaam; deze staat meestal achter of onder de merknaam. U kunt deze ook terugvinden in de bijsluiter

Alle onderstaande medicatie moet u uiterlijk 3 dagen voor de test te stoppen.

- Alimemazine
- Betahistine
- Cetirizine
- Chloorcyclizine/cinnarizine
- Cinnarizine
- Clemastine
- Cyclizine
- Desloratidine
- Dimetindene
- Ebastine
- Fexofenadine
- Flunarizine
- Hydroxyzine
- Ketotifen
- Levocetirizine
- Loratidine
- Meclozine
- Meclozine/pyridoxine
- Mizolastine
- Oxomemazine
- Piracetam
- Promethazine
- Rupatadine
- Sulpiride