

Stoppen met medicijnen voor de uitvoering van een geneesmiddelprovocatie

De provocatie met geneesmiddelen

U hebt binnenkort een afspraak voor het verrichten van een provocatie met geneesmiddelen op de polikliniek KNO. Mogelijk wordt u hiervoor kortdurend opgenomen.

Bepaalde medicijnen kunnen deze provocatie verstoren. Als u zulke medicijnen gebruikt, moet gekeken worden of het mogelijk is om daar voor de provocatie mee te stoppen.

Lijst met medicijnen die u veilig kunt stoppen

In deze folder vindt u een lijst met de namen van medicijnen die de provocatie kunnen verstoren. Het gaat hier om medicijnen die u veilig - zonder overleg met uw arts - kunt stoppen voordat u voor de provocatie naar het ziekenhuis komt.

Met het innemen van de medicijnen die in de lijst genoemd staan moet u uiterlijk 3 dagen voor het polibezoek stoppen.

U gebruikt medicijnen die niet in deze folder staan

Gebruikt u medicijnen die niet in deze folder genoemd worden, dan vragen wij u contact op te nemen met de polikliniek KNO. De allergie-assistente van deze polikliniek kan u vertellen of deze medicijnen de provocatie kunnen verstoren. Is dat het geval, dan gaat de allergie-assistente na of het mogelijk is om met deze medicijnen te stoppen. Misschien zijn deze medicijnen zo belangrijk voor uw gezondheid, dat u er niet mee mag stoppen. Stop nooit zonder overleg met de polikliniek met medicijnen die niet in deze folder genoemd worden!

Als u de genoemde medicijnen niet kunt stoppen

Als u medicijnen gebruikt die de provocatie kunnen verstoren, maar u kunt deze niet stoppen, bijvoorbeeld omdat u klachten krijgt, kan de provocatie niet bij u uitgevoerd worden. Neemt u dan s.v.p. contact op met de allergie-assistente van de poli KNO, T: 020 444 1140 (locatie VUmc) of 020 566 2888 (locatie AMC). Deze stelt de specialist daarvan op de hoogte. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen door de allergie-assistente of de arts.

Medicatie die u veilig kunt stoppen voorafgaand aan de provocatietest

Let op: er worden alleen stofnamen genoemd, geen merknamen! Kijk s.v.p. goed op de verpakking naar de stofnaam; deze staat meestal achter of onder de merknaam. U kunt deze ook terugvinden in de bijsluiter

Alle onderstaande medicatie moet u uiterlijk 3 dagen voor de test te stoppen.

- Alimemazine
- Betahistine
- Cetirizine
- Chloorcyclizine/cinnarizine
- Cinnarizine
- Clemastine
- Cyclizine
- Desloratidine
- Dimetindene
- Ebastine
- Fexofenadine
- Flunarizine
- Hydroxyzine
- Ketotifen
- Levocetirizine
- Loratidine
- Meclozine
- Meclozine/pyridoxine
- Mizolastine
- Oxomemazine
- Piracetam
- Promethazine
- Rupatadine
- Sulpiride