

Longfunctie

Stoppen met medicatie voorafgaand aan metacholineprovocatietest

Uw arts heeft voor u een metacholineprovocatietest aangevraagd. Sommige medicijnen beïnvloeden dit onderzoek. Wij vragen u daarom de inname van het door u gebruikte medicijn te staken volgens onderstaande lijst.

Wanneer u toch een van deze geneesmiddelen heeft ingenomen, verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met de afdeling longfunctie:

telefoon: 020-444 4324 tussen 08:00 en 16:30 uur

Ook als u nog vragen heeft over het al dan niet en op welk tijdstip stoppen van medicatie, kunt u dit nummer bellen.

8 uur voorafgaand:

- Aerolin^R - salbutamol
- Aeromir^R - salbutamol
- Allergocrom^R, Lomudal^R, Lomusol^R - cromoglicinezuur
- Berotec^R - fenoterol
- Bricanyl^R - terbutaline
- Ventolin^R - salbutamol

24 uur voorafgaand:

- Atrovent^R - ipratropium
- Berodual^R - fenoterol + ipratropium
- Combivent^R - salbutamol + ipratropium
- Eklira Genuair^R - aclidinium
- Ipramol^R - salbutamol + ipratropium
- Singulair^R - montelukast

48 uur voorafgaand:

- AeriesR - desloratadine
- Allerfre - loratadine
- Atarax - hydroxizyne
- AtimosR - formoterol
- Cetirizine
- Claritine^R - loratadine
- Desloratadine
- Duaklir Genuair^R - formoterol + aclidinium
- Duoresp Spiromax^R - formoterol + budesonide
- Euphylline^R, Theolair^R, Theolair retard^R - theophylline
- Fenistil^R - dimitindeen

- Foradil^R - formoterol
- Fostair^R - formoterol + beclometason
- Foster^R - formoterol + beclometason
- Flutiform^R - formoterol + fluticason
- Levocetirizine
- Loratadine
- Mebhydroline + napadisilaat (antihistaminicum)
- Mircol^R - mequitazine
- Neoclarityn^R - mdesloratadine
- Oxis^R - formoterol
- Plusvent^R - salmeterol
- Polaramine^R - dexchlorfeniramine
- Prometazine (zowel drank als tabletten)
- Seretide^R - salmeterol + fluticason
- Serevent^R - salmeterol
- Spiolto^R - tiotropium + olodaterol
- STPfree^R - fexofenadine
- Symbicort^R - formoterol + budesonide
- Tavegil^R - clemastine
- Tilade^R - nedocromil
- Tinset^R - oxatomide
- Xyzal^R - levocetirizine
- Zaditen^R - ketotifen

4 dagen voorafgaand:

- Anoro^R - vilanterol en umeclidinium
- Ellipta^R - (is de toedieningsvorm van bv Anoro, Breo, Relvar, Trelegy)
- Bevespi^R - glycopyrronium + formoterol
- Onbrez^R - indacaterol
- Relvar^R - fluticasonfuroaat + vilanterol
- Seebri^R - glycopyrronium bromide
- Spiriva^R - tiotropium
- Striverdi^R - olodaterol
- Tiotrus^R - tiotropium
- Trelegy Ellipta^R - fluticasonfuroaat/umeclidinium/vilanterol
- Trimbow^R - beclometason/formoterol/glycopyrronium
- Ultibro Breezhaler^R - indacaterol en glycopyrronium bromide
- Bevespi^R - glycopyrronium + formoterol

Deze medicijnen hoeft u niet te stoppen:

- Aerobec^R - beclometason
- Alvesco - ciclesonide
- Becotide^R, Becloforte^R - beclometason
- Celestone^R - betametason
- Dexamethasonum
- Flixotide^R - fluticason
- Prednison, prednisolonum
- Pulmicort^R - budesonide
- Qvar^R - beclometason